

Primovist®- Ácido gadoxético. Reg. MS - 1.7056.0086 - 0,25 mmol/mL solução para injeção. Composição 1 ml de solução para injeção contém 181,43 mg de ácido gadoxético, Gd-EOB-DTPA dissódico, equivalente a 0,25 mmol de Gd-EOB-DTPA dissódico. **Indicações:** Primovist® é indicado para a detecção de lesões focais hepáticas e fornece informações sobre o caráter das lesões em imagens de ressonância magnética (RM) ponderadas em T1. Este produto médico destina-se somente a uso para diagnóstico. **Contraindicações:** Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. **Precauções:** Deve-se ter cuidado em pacientes com comprometimento renal grave devido à reduzida capacidade de eliminação do Gd-EOB-DTPA. Pacientes com comprometimento renal: Houve relatos de Fibrose Sistêmica Nefrogênica (FSN) associada ao uso de alguns agentes de contraste contendo gadolínio em pacientes com comprometimento renal grave, agudo ou crônico (GFR < 30ml/min /1.73 m²) ou insuficiência renal aguda de qualquer intensidade, devido à síndrome hepato-renal ou no período perioperatório de transplante de fígado. Como existe uma possibilidade de ocorrência de FSN com Primovist®, este, portanto, só deve ser usado nesses pacientes após cuidadosa avaliação do risco/benefício e se as informações diagnósticas forem essenciais e não estiverem disponíveis com imagens de ressonância magnética (RM) não realçada com contraste. Os pacientes com história de reações alérgicas/alergóides ou asma brônquica podem estar mais arriscados a reações graves. As reações de hipersensibilidade podem ser mais intensas em pacientes fazendo uso de betabloqueadores, particularmente na presença de asma brônquica. Se ocorrerem reações de hipersensibilidade, a injeção do meio de contraste deve ser descontinuada imediatamente. **Interação medicamentosa:** Estudos em ratos mostraram que a Rifampicina reduz significativamente o realce do fígado pelo ácido gadoxético. **Posologia:** A dose indicada é de 0,025 mmol/kg pc, o que na prática significa 0,1 ml da solução/kg pc. Para informações mais detalhadas, gentileza consultar a bula do produto. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

Contraindicações: Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes. **Interação medicamentosa:** Estudos em ratos mostraram que a Rifampicina reduz significativamente o realce do fígado pelo ácido gadoxético.

Destinada exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos



L.BR.MKT.05.2018.10085